

# GETUR ÞÚ HJÁLPAÐ ... ÞEGAR Á REYNIR?

**1** Tryggðu fyrst eigið öryggi og síðan annarra

**2** Hringdu í

**112**  
INN EINN TVEIR

**3** Opnaðu öndunarveginn og reyndu endurlífgun ef ekki finnst lífsmark

**4** Stöðvaðu blæðingu

## ENDURLÍFGUN

**Notaðu blástursaðferð**  
– ef viðkomandi andar ekki.

**Veittu hjartahnoð**  
– ef ekkert lífsmark finnst.



### Blástursaðferð og hjartahnoð

- 112**
- Hringdu í 112 ef um skyndilegt meðvitundarleysi er að ræða.
  - Opnaðu öndunarveginn með því að sveigja höfuðið aftur.
  - Leitaðu að lífsmarki, öndun eða hreyfingum.
  - Klemmdu fyrir nef og blástu í munn.
  - Blástu rétt þannig að þú sjáir brjóstakassann lyftast.
  - Hnoðaðu á miðjan brjóstakassa með beinum handleggjum.
  - Haltu áfram að blása og hnoða á vexti þar til sjúkrahúsi kemur.

#### Hnoðaktur – 100x á mínútu

|              | blása | hnoða |
|--------------|-------|-------|
| • Fullorðnir | 2x    | 15x   |
| • Börn       | 1x    | 5x    |

Ef þú treystir þér ekki til að beita blástursaðferð skaltu eingöngu beita hjartahnoði. Það gerir líka gagn.



### Aðskotahlutur í öndunarvegi

**Einkenni:** Viðkomandi grípur um háls, getur ekki talað eða andað og fer að blána.

#### Skyndihjálp – ungbörn:


- Sláðu 5 sinnum á milli herðablaðanna.
- Þrýstu 5 sinnum á brjóstakassann.
- Endurtaktu ferlið þar til barnið andar eða sérhæfð aðstoð berst.

Ef barnið missir meðvitund skaltu hringja í 112 og hefja endurlífgun með blæstri og hjartahnoði.



#### Skyndihjálp – börn frá 1 árs og fullorðnir:

- Stattu fyrir aftan viðkomandi og griptu um kvíð hans rétt fyrir ofan nafla.
- Kreptu hnefa annarrar handar og griptu um hnefann með hinni hendinni.
- Þrýstu snöqqt inn á við og upp.
- Endurtaktu ferlið þar til aðskotahluturinn hrekkur út eða sérhæfð aðstoð berst.
- Ef viðkomandi missir meðvitund skaltu hringja í 112 og hefja endurlífgun með blæstri og hjartahnoði.



## SLYS

### Tryggðu öryggi á slysstað

- Stöðvaðu umferð að slysstað.
- Settu öryggisþríhyrning í 200 metra fjarlægð.
- Stökkðu ald.
- Skorðu bilflak ef hættu er á að það velti.
- Aftengdu rafmagn ef um rafmagnsslys er að ræða.



### Brunasár

- Skyndihjálp:**
- Stöðvaðu brunann.
  - Kældu brennda svæðið strax.
  - Ef bruninn nær yfir stórt svæði skaltu hringja í 112.



### Höfuðhögg

**Einkenni alvarlegs höfuðhöggs:** Rot, sljóleiki, minnstap, uppköst, höfuðverkur, krampaflög.

- Skyndihjálp:**
- Athugaðu meðvitund, öndun og lífsmark.
  - Hringdu í 112 ef höfuðhöggið virðist alvarlegt.
  - Haltu höfðinu kyrru vegna hættu á hálsáverka.
  - Ef engin alvarleg merki eru sjáanleg og höfuðhöggið virðist minniháttar skal fylgjast með viðkomandi í a.m.k. 6 klst.



### Beinbrot

- Skyndihjálp:**
- Stöðvaðu blæðingu.
  - Skorðu hrottið val með spalki ef nauðsynlegt er að hreyfa viðkomandi.



Eftir hátt fall, harðan árekstur eða bilveltu skal hringja í 112 og láta flytja viðkomandi til lækni- og sálfræðingar – án tillits til þess hvort áverkar sjást.

## BRÁÐ VEIKINDI

### Bráðaofnæmi

**Einkenni:** Öndunarerfiðleikar, bólga á vörum, tungu eða í hálsi, útbrot, hraður hjartsláttur.

- 112**
- Skyndihjálp:**
- Hringdu í 112.
  - Aðstoðaðu við notkun adrenalínenna ef viðkomandi á slíkan penna.



### Sykursýki – of lágur blóðsykur

**Einkenni:** Breyting á hegðun, skjálfti, fölvi, sviti, hungurtilfinning, krampar.

- Skyndihjálp:**
- Gefðu viðkomandi sykur (djús, súkkulaði, gos, sykurmola) ef hann getur kyngt.
  - Hringdu í 112 ef viðkomandi getur ekki kyngt eða vaknar ekki.

#### Flog

- 112**
- Skyndihjálp:**
- Hringdu í 112.
  - Verðu viðkomandi fyrir meiðslum.
  - Tryggðu að ekkert þrengi að öndun.
  - Vertu hjá viðkomandi þar til kastíð líður hjá.
  - Reyndu að leggja viðkomandi á hliðina.
  - Ekkert setja neitt upp í viðkomandi.

### Brjóstverkur

**Einkenni:** Verkur fyrir brjósti sem leiðir oft út í handlegg og/eða háls, sviti og ógleði.

**Skyndilegur brjóstverkur hjá einstaklingi yfir 35 ára getur stafað af kransæðastíflu.**

- 112**
- Skyndihjálp:**
- Hringdu í 112.
  - Tryggðu eftir megni kyrrð og ró.
  - Hagráðu viðkomandi í þægilega stöðu.
  - Aðstoðaðu viðkomandi við að taka lyf hafi lækni ávísað þeim.
  - Ef viðkomandi missir meðvitund og hættir að anda skaltu hefja endurlífgun með blæstri og hjartahnoði.

